

EGD con INSTRUCCIONES BRAVO

Una EGD (esofagogastroduodenoscopia) con colocación de Bravo es un procedimiento que combina una endoscopia superior (EGD) con un sistema de monitorización de pH Bravo para evaluar el reflujo ácido o la ERGE. Durante la EGD, se conecta un pequeño dispositivo similar a una cápsula (Bravo) al revestimiento del esófago. Esta cápsula mide los niveles de pH y transmite los datos a un receptor que el paciente lleva puesto durante 48 horas. Los datos ayudan a los médicos a diagnosticar y controlar el reflujo ácido.

El dispositivo de monitoreo de Ph Bravo DEBE devolverse cuando se complete el estudio (48 horas). NO SE PUEDE ENVIAR POR CORREO.

No coma ni beba nada, excepto medicamentos con un sorbo de agua, durante **al menos 8 horas** antes del procedimiento.

Cepillarse los dientes antes del procedimiento: La cantidad de agua utilizada para cepillarse los dientes es incidental. Es aceptable cepillarse los dientes y enjuagarse la boca con agua hasta el momento de su procedimiento.

Las instrucciones de medicación de su médico para este procedimiento:

*Deténgase 1 semana antes de la prueba: Prilosec (omeprazol), Prevacid (lansoprazol), Nexium (esomeprazol), Aciphex (rabeprazol), Protonix (pantoprazol), Dexilant (dexlansoprazol)

*Detener 72 horas antes de la prueba: Zantac (ranitidina), Pepcid (famotidina), Axid (nizatidina), Tagamet (cimetidina)

*Parada 24 horas antes de la prueba: Maalox, Mylanta, Tums, Roloids, Amphogel, Gaviscon

NOTA: Someterse a una resonancia magnética mientras la cápsula Bravo está en su cuerpo podría resultar en daños graves en su tracto intestinal o cavidad abdominal. Si necesita una resonancia magnética dentro de los 30 días posteriores a este procedimiento, comuníquese con su médico.

Preparación para su EGD con el procedimiento Bravo

DIABÉTICOS CONTROLADOS CON INSULINA:

La mañana de su procedimiento:

- No tome Humalog ni insulina regular. Si está tomando NPH o Lente, tome la MITAD (1/2) de su dosis normal.
- Si está tomando insulina Lantus, no cambie su dosis.
- Controle su nivel de azúcar en la sangre por la mañana como de costumbre e informe el nivel a la enfermera cuando sea admitido para el procedimiento.
- Si su nivel de glucosa es bajo, puede tomar tabletas de glucosa con un pequeño sorbo de agua.
- Reanude su dosis normal de insulina después de su procedimiento y si tolera los sólidos.

DIABÉTICOS CONTROLADOS ORALMENTE:

El día de su procedimiento:

- No tome ningún medicamento, excepto Actos o Avandia, ya que estas dosis deben seguir siendo las mismas de siempre.
- Controle su nivel de azúcar en la sangre esa mañana e informe el nivel a la enfermera cuando sea admitido para su procedimiento.
- Puede tomar tabletas de glucosa si su nivel de azúcar en la sangre es bajo esa mañana con un pequeño sorbo de agua.
- Reanude sus medicamentos normales después del procedimiento y si tolera los sólidos.